

## Antifungales Orales

Estos son agentes antifúngicos de amplio espectro que pueden tomarse por vía oral. Estos medicamentos de prescripción están aprobados por la FDA para el tratamiento de las infecciones por hongos o moho, pero NO tienen una indicación específica para el tratamiento de la rinosinusitis por hongos.

### Itraconazol

- Sus enzimas hepáticas serán monitoreadas periódicamente por análisis de sangre.
- Tome la dosis de Itraconazole a la misma hora todos los días después de una comida completa.
- Los antiácidos pueden reducir la absorción de este medicamento y si es necesario deben tomarse al menos 2 horas después de tomar Itraconazol.
- Si está tomando medicamentos para el estómago, asegúrese de beber bebidas de soda con Itraconazol para ayudarlo a ser absorbido.
- Informe cualquier signo o síntoma de fatiga inusual, anorexia, náuseas y / o vómitos, ictericia (piel amarillenta), orina oscura o heces pálidas.
- Otros efectos secundarios potenciales incluyen enzimas hepáticas elevadas, trastornos gastrointestinales, erupción cutánea, hipertensión, hipertensión ortostática, dolor de cabeza, malestar, mialgia, vasculitis, edema y vértigo.
- Comuníquese con su médico ANTES de comenzar cualquier nuevo medicamento mientras esté tomando Itraconazol.
- Las mujeres deben usar medidas efectivas para PREVENIR el embarazo durante y hasta 2 meses después de terminar el itraconazol.
- Itraconazol no debe tomarse con una clase de medicamentos para bajar el colesterol conocidos como estatinas (por ejemplo, Lipitor), a menos que su médico le haya indicado específicamente que lo haga.

Advertencia: Se han notificado casos raros de toxicidad hepática reversible en pacientes que toman itraconazol. Los ritmos cardíacos anormales y la insuficiencia cardíaca congestiva con muerte, que amenazan la vida, también han sido reportados en aproximadamente 60 pacientes.

### Voriconizol (VFend)

- El trabajo de sangre de base para controlar el hígado y los riñones se ordenará.
- VFEND debe tomarse al menos una hora antes o una hora después de una comida.
- No conduzca por la noche mientras toma VFEND. VFEND puede causar cambios en la visión, incluyendo borrosidad y / o fotofobia (sensibilidad a la luz).
- Evite la luz solar fuerte y directa durante la terapia VFEND.
- Los eventos adversos más frecuentemente reportados con uso de voriconazol son trastornos visuales, fiebre, erupción cutánea, vómitos, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, sepsis, edema, dolor abdominal y trastornos respiratorios.

Hay un número sustancial de interacciones entre fármacos con voriconazol. Los fármacos, que reducen la exposición efectiva del voriconazol, incluyen rifampicina, refabutina, fenitoína y carbamazapina. Interacciones con otros fármacos que aumentan la exposición a estos fármacos, incluyendo los antihistamínicos (terfenadina y astemizol), prednisolona, sirolimus, ciclosporina (media dosis), tacrolimus (reducir la dosis a un tercio), ergotamina, warfarina, sulfonilureas, estatinas, midazolam y Otras benzodiazepinas, vincristina y algunos medicamentos para el VIH.

